

How to Spot Signs of X-Disease in Cherries

SYMPTOMS: Little, pale-red to greenish-white fruit that do not taste ripe. Some cherries might be pointed or flat-sided. These cherries will not ripen. Normal-looking fruit on a branch with unripe fruit will have poor flavor. *Look for these little cherries 2 weeks before and through harvest.*



Find more
information
about
X-Disease:



Oregon State
University

This publication will be made available in an accessible alternative format upon request. Please contact puborders@oregonstate.edu or 1-800-561-6719. © 2020 Oregon State University. Oregon State University Extension Service is an AA/EOE/Veterans/Disabled.

Published March 2020

Cómo detectar los signos de la enfermedad de X en las cerezas

SÍNTOMAS: Frutos pequeños, de un color rojo pálido o blanco verdoso y sin sabor maduro. Algunas cerezas podrían tomar forma puntiaguda o tener un lado plano. Estas cerezas no madurarán. La fruta que parece normal no tendrá buen sabor si hay fruta inmadura en la misma rama. Comience a buscar estas cerezas pequeñas dos semanas antes de la cosecha y continúe hasta finalizada la cosecha. Busque más información sobre la enfermedad de X:



<http://s3-us-west-2.amazonaws.com/treefruit.wsu.edu/wp-content/uploads/2019/02/08200245/Como-muestrear-la-cereza-peque%C3%B1a.pdf>

Esta publicación estará disponible en formato accesible a petición. Favor de ponerse en contacto con puborders@oregonstate.edu o 1-800-561-6719. © 2020 Oregon State University. El Servicio de Extensión de Oregon State University es una institución de AA/EOE/Veterans/Disabled.

Publicado en marzo de 2020